



Wskazania do biopsji mammotomicznej

1. Torbiel nawracająca objawowa (w opisie usg piersi BIRADS 2).
2. Gruczolakowłóknik (fibroadenoma), gruczolak (fibroma) piersi poniżej 2 cm u kobiet poniżej 30 roku życia z karcinofobią lub planującymi ciążę.
3. Gruczolakowłóknik (fibroadenoma), gruczolak (fibroma) piersi poniżej 2 cm u kobiet powyżej 30 roku życia zawsze, chyba że obraz jest stabilny (do rozważenia).
4. Zmiany podejrzane do 2 cm (w opisie usg piersi BIRADS 4) w tym : - rozrosty wewnątrzprzewodowe (poszerzone przewody z podejrzeniem brodawczaków, podejrzenie brodawczaków), torbiele z podejrzanym rozrostem
5. Zmiany podejrzane BIRADS 5 do diagnostyki.
6. Niewielkie makrozwapnienia widoczne w obrazie usg piersi.
7. Każdorazowo wskazania do biopsji mammotomicznej mogą być poszerzone w przypadku zwiększonego ryzyka wystąpienia raka piersi.
8. Kwalifikacje zmian innej wielkości po konsultacji z lekarzem.

Ostateczna kwalifikacja do zabiegu biopsji mammotomicznej odbywa się na podstawie kwalifikacji lekarza z uwzględnieniem wywiadu i wyników badań obrazowych.