



Biopsja mammotomiczna - istotne informacje dla pacjenta przed zabiegiem

Przed wykonaniem biopsji mammotomicznej pacjent powinien poinformować lekarza o swoich chorobach lub dolegliwościach w istotny sposób mogących wpłynąć na stan jego zdrowia po wykonaniu zabiegu w tym w szczególności:

1. Zaburzeniach krzepliwości krwi w tym zakrzepicy.
2. Przyjmowaniu leków przeciwkrzepliowych.
3. Uczuleniu na środki znieczulające miejscowo lub inne środki farmaceutyczne używane podczas zabiegu.
4. Tendencjach do tworzenia bliznowców (keloidu).
5. Skokach ciśnienia.
6. Tendencjach do omdleń.
7. Cukrzycy.
8. Zakażeniu HIV.
9. Zakażeniu żółtaczką zakaźną.
10. Zakażeniu inną chorobą zakaźną.
11. Zapaleniu wątroby.
12. Cięży lub karmieniu piersią

Przed wykonaniem zabiegu pacjent powinien mieć wykonane minimum badania:

1. Morfologia krwi.
2. Układ krzepnięcia.

W przypadku przyjmowania leków przeciwkrzepliowych np. Aspiryna, Acenokumarol, Acard odstawić leki na kilka dni przed zabiegiem (z reguły na 2 - 3 dni przed zabiegiem i włączać po 2 - 3 dniach po zabiegu) po uprzedniej konsultacji z lekarzem leczącym !

Może być konieczność przyjmowania leków przeciwkrzepliowych w postaci iniekcji podskórnych (np. Fraxiparyna)- do uzgodnienia z lekarzem zlecającym leki.